

## مطالعه شبکه ژنی موثر بر رشد ماهیچه سینه جوجه راس تحت داده‌های

## RNA-Seq

## Study of the genetic network that affecting the growth of pectoralis muscle in Ross chickens under RNA-Seq data

سید نادر آلبوشوکه<sup>۱</sup>، مجتبی طهمورث‌پور<sup>۲\*</sup>، محمدرضا بختیاری‌زاده<sup>۳</sup>، محمدرضا نصیری<sup>۴</sup>،سعید اسماعیل‌خانیا<sup>۴</sup>Seyed Nader Albooshoke<sup>1</sup>, Mojtaba Tahmoorepur<sup>2\*</sup>, Mohammad Reza Bakhtiarizadeh<sup>3</sup>, Mohammadreza Nassiri<sup>2</sup>, Saied Esmaeilkhani<sup>4</sup>

۱- مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

۲- گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

۳- گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، واحد ابوریحان، ایران

۴- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

1- Department of Animal Science, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ahwaz, Iran.

2- Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3- Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, College of Aburaihan, Iran.

4- Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

\* نویسنده مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: Tahmoores@um.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۹۶/۶/۲۳ - تاریخ پذیرش: ۹۶/۱۱/۱۹)

## چکیده

## واژه‌های کلیدی

جوجه راس،

شبکه ژنی،

ماهیچه،

هستی‌شناسی ژن،

توالی‌یابی RNA

جوجه‌های بومی جز مهم‌ترین ذخایر ژنتیکی هستند که به شرایط محیطی بخوبی سازگاری یافته‌اند. اما بطور معمول سرعت رشد و راندمان غذایی آنها در مقایسه با جوجه‌های امروزی نامناسب است. مطالعات مقایسه‌ای بین جوجه‌های امروزی و جوجه بومی امکان درک علل این تفاوت‌های ژنتیکی را مهیا می‌سازد. جهت بررسی تفاوت‌های ترانسکریپتومی ژن‌ها و مسیرهای بیولوژیکی مرتبط با رشد ماهیچه سینه در دو گروه جوجه بومی و جوجه تجاری از مطالعات ژنومی تکنولوژی‌های توالی‌یابی نسل آینده استفاده شد. در این پژوهش تعداد ۲۰۰ قطعه پرند از سویه راس ۷۰۸ و ۲۰۰ قطعه جوجه بومی اصفهان در یک شرایط مشابه مدیریتی و تغذیه استاندارد پرورش داده شدند. در بررسی تجزیه و تحلیل داده‌های RNA-Seq بین دو گروه آزمایشی، پروفایل بیان ژن در ۴ نمونه ماهیچه سینه ۲۸ روزگی عمر جوجه‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه آماری بیان ژن‌های توالی‌یابی شده در این دو گروه، ۶۰۶ ژن با تفاوت معنی‌دار را مشخص کرد. در جوجه تجاری از این تعداد ۳۵۷ ژن افزایش بیان و ۲۴۹ ژن کاهش بیان نشان دادند. شبکه برهم کش پروتئین-پروتئین با استفاده از ۲۶۷ ژن تشکیل و از این تعداد ۷۵ ژن در قالب سه ماژول با حداکثر سطح معنی‌داری شناسایی شد. بررسی‌های هستی‌شناسی ژنی نشان داد هر سه ماژول در رشد ونمو ماهیچه سینه نقش موثری را ایفا کرده و ژن‌های شاخص آن‌ها EGR1، JUN، THBS1 و ITGA4 و ACTA2 بودند.

## مقدمه

مرغ اهلی از جمله مهم‌ترین و با راندمان‌ترین حیوان‌های پرورشی است. نژادهای جوجه بومی بعنوان ذخایر مهم ژنتیکی که در طی هزاران سال ایجاد شده، شناخته شده‌اند در مقایسه با نژادهای امروزی، جوجه بومی با شرایط محیطی محلی سازگاری بالاتری داشته و نسبت به بیماری‌ها مقاومت بالاتری نشان می‌دهند (Hall & Bradley, 1995).

با این حال سرعت رشد کمتر و راندمان غذایی نامناسب جوجه بومی در ثبات عرضه و تولید آن مشکلاتی را ایجاد کرده است. بنابراین اصلاح نژاد جوجه بومی و افزایش سرعت رشد یکی از اهداف مراکز پرورش این نوع مرغ است. تولید و تکثیر مرغان بومی ایران در یک چهارچوب طرح ملی در سال ۱۹۸۴ میلادی در شش ایستگاه اصلاح نژادی در استانهای مختلف کشور (مازندران، فارس، اصفهان، آذربایجان غربی، یزد و خراسان) آغاز شد. مرکز اصلاح نژاد جوجه بومی اصفهان از جمله این ایستگاه‌ها است که با دو هدف اصلی اصلاح نژاد و تکثیر جوجه بومی دوماظوره‌ای که قادر به تولید مناسب گوشت و تخم مرغ باشد، تشکیل شد (Yousefi Zonuz, Alijani, Mohammadi, Rafat, & Daghigh Kia, 2013). جوجه بومی اصفهان دارای سرعت رشد پایین، اندازه بدن نسبتا کوچک بوده ولی در مقابل بیماری‌ها و شرایط محیطی مقاومت بالایی دارد. برخی خصوصیات این مرغ در جدول شماره ۱ نشان داده شده است (Yousefi Zonuz et al., 2013). افزایش وزن ماهیچه و بخصوص ماهیچه سینه مرغ نقشی مهم در رشد بدن و به همان ترتیب اقتصادی کردن تولید گوشت و سودآوری صنعت پرورش مرغ گوشتی ایفا می‌کند. بنابراین شناسایی مکانیزم‌های ژنتیک مولکولی و ژن‌های کاندیدا در رشد و نمو ماهیچه مرغ اهلی می‌تواند در

سرعت بخشیدن به اصلاح نژاد جوجه بومی اصفهان سودمند شود.

جدول ۱ - خصوصیات آماری برخی صفات جوجه بومی اصفهان

Table 1. Descriptive statistics for the traits in Isfahani's native chickens

| Trait             | N     | Mean    | SD           | CV         |
|-------------------|-------|---------|--------------|------------|
| صفت               | تعداد | متوسط   | انحراف معیار | ضریب تغییر |
| Bw0 <sup>a</sup>  | 52034 | 37.75   | 3.57         | 9.47       |
| BW8 <sup>a</sup>  | 46310 | 820.82  | 181.96       | 21.13      |
| BW12 <sup>a</sup> | 42201 | 1461.37 | 287.35       | 19.66      |
| WSM <sup>b</sup>  | 15269 | 1875.60 | 211.10       | 11.25      |
| ASM <sup>c</sup>  | 15380 | 179.26  | 17.23        | 9.61       |
| EN <sup>d</sup>   | 14456 | 48      | 13.69        | 20.43      |

<sup>a</sup>وزن بدن در روز هجری، ۸ و ۱۲ هفتهگی به ترتیب با Bw8, Bw0.

Bw12 نمایش داده شده‌اند.

<sup>b</sup>سن در بلوغ جنسی با WSM، سن نخستین تخمگذاری با ASM.

<sup>d</sup>تعداد تخم مرغ با EN نشان داده شده‌اند.

اگرچه رشد و نمو یک فرایند پیچیده و شامل مراحل متعدد تکثیر و تمایز است (Oksbjerg, Gondret, & Vestergaard, 2004) منتهی گزارش شده در طی رشد و نمو و با مقایسه پروفایل بیان ژنی ماهیچه‌های بین نژادهایی که از نظر سرعت رشد ماهیچه تفاوت دارند می‌توان این مکانیزم‌های مولکولی را شناسایی کرد (Xu et al., 2012). از طرفی دیگر جوجه راس ۷۰۸ یکی از جوجه های گوشتی پرورشی امروزی است که می‌تواند در عرض ۸ هفته دوره پرورش از وزن ۴۰ گرمی در روز نخست عمر به وزنی بیش از ۴ کیلوگرم برسد و بنابراین جزء مرغان با سرعت رشد بسیار بالا محسوب می‌شود. توده ماهیچه در نتیجه یک تعادل بسیار دقیق مابین فرایندهای ساخت و تجزیه پروتئین‌های فیبر ماهیچه‌ای، کنترل و حفظ می‌شود. افزایش ساخت پروتئین موجب هایپرتروفی و افزایش تجزیه پروتئین‌ها موجب آتروفی می‌شوند. بازگردش (Turn over) پروتئین بوسیله مسیرهای سیگنالی مختلفی تنظیم می‌شود. گزارشات متعددی نشان می‌دهند که بازگردش کل پروتئین بدن در

جوجه هاى گوشتى کمتر از مرغ تخمگذار است (Muramatsu, Hiramoto, & Okumura, 1990; ) (Saunderson & Leslie, 1988). دو مسير سيگنالى اصلى كنترل ساخت پروتئين را انجام مى دهند و عبارتند از IGF- myostatin-Smad2/3 كه تنظيم كننده مثبت و Akt-mTOR تنظيم كننده منفي ساخت پروتئين هستند ( Schiaffino, Dyar, Ciciliot, Blaauw, & Sandri, 2013). اغلب مطالعات انجام شده در مرغ اهلى ژن هاى بسيار مهم و مسيرهاى دخيل مرتبط با رشد ناشى از هايپرتروفي ماهيچه را گزارش کرده اند. در جوجه هاى گوشتى بهگزين شده براى توليد حجم سینه بالاتر بيان ژن IGF-1 و MSTN دو عامل مهم كنترل كننده رشد و نموى فيبرهاى ماهيچه است (Guernec et al., 2003). در يك تحقيق با استفاده از آزمون ريز آرايه (Microarray) و بررسى بيان ژنى دو گروه خروس با راندمان هاى غذايى بالا و پايين گزارش شد ۲۷ ژن با اختلاف بيان معنى دار بين اين دو گروه وجود دارد (Bottje et al., 2012). از اين تعداد ۱۴ ژن در گروه با راندمان غذايى بالا غنى شده (Enriched) كه در مسيرهاى انتقال سيگنال و حسگرهاى وضعيت انرژى سلول و محرک توليد انرژى دخالت داشته و ۱۳ ژن نيز در گروه با راندمان غذايى پايين غنى شده كه در ساختمان اسكلت سلولى (نظير فيلامنت هاى اكتين و ميوزين)، اكسيداسيون چربى، عوامل رشد و پاسخ به تنش اكسيداتيوى دخالت دارند. مقايسه و تجزيه و تحليل ژن هاى بيان شده در شش و ۲۱ روزگى ماهيچه سینه در جوجه گوشتى و جوجه اصلاح نژاد شده نشان داد برخى تنظيم كننده هاى رشد ميوزنى با اثر مثبت (IGF-1, IGF1R و WFIKKN2) و يا اثر منفي (ACE و MSTN) در رشد ميوفبرهاى ماهيچه اى در دوره پس از هچرى موثر هستند (Davis & Austic, 1997). همچنين در يك تحقيق ديگر با استفاده از روش ريز آرايه و مقايسه پروفایل بيان ژنى جوجه گوشتى آرپور آكرس (Arbor Acres) و جوجه تخمگذار لگهورن (Leghorn) در سنين مختلف تا ۸ هفته گزارش شد بيان ژن هاى مرتبط با تجزيه پروتئين در جوجه گوشتى کمتر از تخمگذار بوده و همين موضوع موجب تجمع بيشتر پروتئين در بافت ماهيچه و بزرگتر شدن بدن جوجه گوشتى مى شود (Zheng et al., 2009). مقايسه پروفایل بيان ژنى ماهيچه سینه نمونه هاى مختلف مراحل نمو مربوط به جوجه بومى بيجينگ (نژاد چينى با سرعت رشد كم) و جوجه گوشتى آرپور آكرس (جوجه تجارتي با سرعت رشد بالا) ۱۹ ژن با بيان متفاوت معنى دار مرتبط به نمو ماهيچه را نشان داد (Cui et al., 2012). يك گزارش ديگر نشان داد بهگزينى درازمدت براى رشد، موجب تغيير الگوى بيان ژن هاى ماهيچه اى مى شود (Yin et al., 2014).

پيچيدگى در گزارشات انجام شده در خصوص رشد و نموى ماهيچه اسكلتى و عوامل موثر در آن كه به تبع آن تعداد ژن هاى دخيل در بروز اين پديده را نيز افزايش مى دهد دلايلى است كه هدف اين پژوهش را به استفاده از مقايسه ترانسكربتومى و تعيين شبكه ژنى و ماژول هاى معنى دار و موثر بر آن سوق داده تا بدین وسيله مسير مطالعات آتى و خط مشى اصلاح نژادى جوجه بومى تدوين و تسهيل شود.

### مواد و روش ها

**روش نمونه گيرى:** براى انجام اين آزمون از ۲۰۰ قطعه جوجه يك روزه سويه تجارى راس ۷۰۸ و ۲۰۰ قطعه جوجه يك روزه از نژاد بومى اصفهان استفاده شد. جوجه ها به سالن مرغدارى مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى صفى آباد دزفول انتقال و تا پايان آزمون با شرايط يكسان و مشابه از نظر تغذيه و مديريت پرورش نگهدارى شدند.

جوجه هاى گوشتى کمتر از مرغ تخمگذار است (Muramatsu, Hiramoto, & Okumura, 1990; ) (Saunderson & Leslie, 1988). دو مسير سيگنالى اصلى كنترل ساخت پروتئين را انجام مى دهند و عبارتند از IGF- myostatin-Smad2/3 كه تنظيم كننده مثبت و Akt-mTOR تنظيم كننده منفي ساخت پروتئين هستند ( Schiaffino, Dyar, Ciciliot, Blaauw, & Sandri, 2013). اغلب مطالعات انجام شده در مرغ اهلى ژن هاى بسيار مهم و مسيرهاى دخيل مرتبط با رشد ناشى از هايپرتروفي ماهيچه را گزارش کرده اند. در جوجه هاى گوشتى بهگزين شده براى توليد حجم سینه بالاتر بيان ژن IGF-1 و MSTN دو عامل مهم كنترل كننده رشد و نموى فيبرهاى ماهيچه است (Guernec et al., 2003). در يك تحقيق با استفاده از آزمون ريز آرايه (Microarray) و بررسى بيان ژنى دو گروه خروس با راندمان هاى غذايى بالا و پايين گزارش شد ۲۷ ژن با اختلاف بيان معنى دار بين اين دو گروه وجود دارد (Bottje et al., 2012). از اين تعداد ۱۴ ژن در گروه با راندمان غذايى بالا غنى شده (Enriched) كه در مسيرهاى انتقال سيگنال و حسگرهاى وضعيت انرژى سلول و محرک توليد انرژى دخالت داشته و ۱۳ ژن نيز در گروه با راندمان غذايى پايين غنى شده كه در ساختمان اسكلت سلولى (نظير فيلامنت هاى اكتين و ميوزين)، اكسيداسيون چربى، عوامل رشد و پاسخ به تنش اكسيداتيوى دخالت دارند. مقايسه و تجزيه و تحليل ژن هاى بيان شده در شش و ۲۱ روزگى ماهيچه سینه در جوجه گوشتى و جوجه اصلاح نژاد شده نشان داد برخى تنظيم كننده هاى رشد ميوزنى با اثر مثبت (IGF-1, IGF1R و WFIKKN2) و يا اثر منفي (ACE و MSTN) در رشد ميوفبرهاى ماهيچه اى در دوره پس از هچرى موثر هستند (Davis & Austic, 1997). همچنين در يك تحقيق ديگر با استفاده از روش ريز آرايه و مقايسه پروفایل بيان ژنى جوجه گوشتى آرپور آكرس (Arbor Acres) و جوجه تخمگذار لگهورن (Leghorn) در سنين مختلف تا ۸ هفته گزارش شد بيان ژن هاى مرتبط با تجزيه پروتئين در جوجه گوشتى کمتر از تخمگذار بوده و همين موضوع موجب تجمع بيشتر پروتئين در بافت ماهيچه و بزرگتر شدن بدن جوجه گوشتى مى شود (Zheng et al., 2009). مقايسه پروفایل بيان ژنى ماهيچه سینه نمونه هاى مختلف مراحل نمو مربوط به جوجه بومى بيجينگ (نژاد چينى با سرعت رشد كم) و جوجه گوشتى آرپور آكرس (جوجه تجارتي با سرعت رشد بالا) ۱۹ ژن با بيان متفاوت معنى دار مرتبط به نمو ماهيچه را نشان داد (Cui et al., 2012). يك گزارش ديگر نشان داد بهگزينى درازمدت براى رشد، موجب تغيير الگوى بيان ژن هاى ماهيچه اى مى شود (Yin et al., 2014).

جهت تایید کیفیت، مجدداً با نرم افزار Fastqc بررسی شدند.

**تجزیه و تحلیل بیان ژن:** از سایت Ensembl به آدرس <http://asia.ensembl.org/info/data/ftp/index.html> ژنوم مرجع و فایل حاوی رفرنس‌دهی ژنوم [Ensembl Galgal4 (GCA\_000002315.2)] دریافت شد. با استفاده از نرم افزار HISAT2 (نسخه 2.0.4) (Kim, Langmead, & Salzberg, 2015) خوانش‌ها به ژنوم مرجع هم‌ردیف شده و با استفاده از نرم افزار Cufflinks (نسخه 2.2.1) (Trapnell et al., 2010) و با استفاده از فایل رفرنس‌دهی ژنوم (حاوی ۱۷۹۵۴ ژن در بانک دانسته‌های Ensembl) به رونوشت‌های بیان شده اسمبل شده تا بدین ترتیب رونوشت‌های شناخته شده و جدید تشخیص داده شوند. سپس با استفاده از ابزار Cuffdiff تفاوت معنی‌داری بیان ژن‌ها (Differential Expressed Genes : DEGs) بررسی شد. بدین منظور نرخ تشخیص اشتباه در سطح ۵ درصد (False Discovery Rate: FDR < 0.05) به عنوان سطح معنی‌دار DEGs در نظر گرفته شد. بیان ژن‌ها به صورت FPKM (fragments per kilobase of transcript per million mapped reads) در نظر گرفته شد.

**هستی‌شناسی ژن‌ها (Gene ontology):** پس از شناسایی و مشخص شدن ژن‌های با تفاوت معنی‌دار (بیش و کم بیان) جهت تجزیه و تحلیل هستی‌شناسی (فرایندهای بیولوژیکی) و نیز مسیر KEGG (Kyoto encyclopedia of genes and genomes) (Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery) استفاده شد (Dennis et al., 2003). در آنالیز نهایی مسیرهای غنی شده مرتبط به هر یک از دو گروه، از P-value تصحیح شده در سطح ۵ درصد ارائه شده توسط بنجامین-هوچبرگ استفاده شد.

تمامی جوجه‌ها از یک جیره غذایی متعادل بر مبنای ذرت و سویا با ۳۰۰۰ کیلوکالری انرژی در کیلوگرم وزن خشک و ۲۰ درصد پروتئین خام تغذیه شدند. دسترسی به آب آشامیدنی و خوراک آزاد بود. در پایان ۲۸ روزگی از هر گروه ۶ قطعه جوجه خروس بطور تصادفی انتخاب، توزین و کشتار شد. در هر جوجه از یک مکان مشابه در ماهیچه سمت چپ سینه (Pectoralis major muscle) یک نمونه تقریباً دوگرمی گرفته شده و در کرایوتیوب‌های استریل و فاقد RNase قرار داده شد. نمونه‌های گرفته شده بلافاصله به تانک ازت مایع منتقل و سپس در آزمایشگاه تا زمان استخراج RNA در فریزر دمای ۸۰- درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

**استخراج و خالص سازی RNA:** با استفاده از تریازول (Invitrogen, USA) و مطابق دستورالعمل شرکت سازنده از نمونه‌ها RNA استخراج شد. خلوص RNA با استفاده از نانودراپ (Thermo Scientific™ NanoDrop 2000) بررسی شد. نسبت جذب ۲۶۰ به ۲۸۰ نانومتر در نمونه‌های RNA در محدوده ۱/۸ تا ۲ بود. سه نمونه RNA مربوط به هر گروه به نسبت مساوی با یکدیگر مخلوط شده تا در کل و به ازای هر یک از دو گروه آزمایشی، ۲ تکرار از نمونه‌های ادغام شده (Pooled) بدست آید. چهار نمونه حاصل با دستگاه Illumina Hiseq 2000 و مطابق دستورالعمل مربوطه در شرکت BGI چین توالی‌یابی شد.

**بررسی کمی و کیفی داده‌ها:** قبل از انجام همترازی (Alignment) کیفیت توالی خوانش‌های خام با استفاده از نرم افزار Fastqc (<http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>) بررسی شد. برای حذف خوانش‌های با کیفیت پایین و یا خوانش‌های خام حاوی توالی‌های مربوط به آدپتور و پرایمر و Poly-N از نرم افزار Trimmomatic (Lohse et al., 2012) استفاده شد. خوانش‌های پیرایش شده

## نتایج


شناسایی ژن‌های بیان شده در ترانسکریپتوم ماهیچه سینه: با استفاده از نمونه‌ی بافت سینه مربوط به شش جوجه خروس از هر یک از دو گروه بومی و تجاری، به صورت خوانش‌های جفتی (2 x 150 bp) توالی‌یابی شد. توالی‌یابی RNA برای چهار نمونه ماهیچه در حدود ۱۳۱ میلیون خوانش جفت بازی ۱۵۰ نوکلئوتیدی تولید کرد که از این مقدار حدود ۹۴ میلیون در جوجه بومی و ۳۷ میلیون در جوجه تجاری بود. پس از فیلتر کیفی خوانش‌های با کیفیت بالا برای هر نمونه به ژنوم مرجع نقشه‌یابی و برای تجزیه و تحلیل بیان ژن استفاده شد. بر اساس گزارش بررسی کیفی پس از ترایمینگ داده‌های خام، میانگین امتیاز کیفی خوانش‌های توالی‌یابی شده برابر ۳۸ و میانگین میزان GC بین ۵۲ تا ۵۴ درصد بود. بنابراین می‌توان استنتاج کرد که کیفیت خوانش‌ها بسیار مطلوب بوده و با حداقل خطا توالی‌یابی شده‌اند. این نتایج نشانه مناسب بودن داده‌ها جهت تجزیه و تحلیل‌های بعدی بود. با استفاده از برنامه Hisat2 بیش از ۷۲ درصد از خوانش‌های تمیز به ژنوم مرجع Galgal4 نقشه‌یابی شد. بعلاوه حدود ۹۰ درصد خوانش‌ها نیز به طور صحیح و در فاصله معقولی نسبت به جفت خود بر روی ژنوم همترازی (الاین) شدند. جزئیات خوانش‌های تمیز (Clean reads) و خصوصیات نقشه‌یابی در جدول شماره (۲) آورده شده است. اغلب خوانش‌های توالی‌یابی شده (۵۸/۳ تا ۶۸/۴۳ درصد) در ناحیه اگزونی و ۲۱/۷ تا ۲۹/۰۸ درصد در ناحیه اینترونی و فقط ۹/۸۶ تا ۱۲/۷۸ درصد در ناحیه بین ژنی قرار داشتند (شکل شماره ۱). پس از انجام تجزیه و تحلیل آماری ۶۰۶ ژن Log2FC (0.8 > و P-adjusted ≤ 0.05) به عنوان ژن‌های با تفاوت معنی‌دار DEGs شناسایی شد. از این تعداد ۲۴۹ ژن در جوجه بومی و ۳۵۷ ژن در جوجه تجاری بیان بالاتر داشتند.

تشکیل شبکه برهم کنش پروتئین-پروتئین (Protein-Protein interaction networks): اکنون معلوم شده است که پروتئین‌ها برای انجام یک عمل خاص در سلول به صورت یکپارچه با یکدیگر همکاری می‌کنند. بنابراین، برای بررسی بیشتر روابط DEGها در سطح پروتئین، با استفاده از پایگاه داده STRING (Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes) شبکه PPI مرتبط با آن‌ها با استفاده از مجموعه داده‌های Gallus gallus ترسیم شد. این پایگاه داده حاوی مقادیر PPI تجربی، پیش‌بینی شده، انتقال یافته و متنی در میان پروتئین‌ها است (Szkarczyk et al., 2014). شبکه‌های ژنی PPI و ماژول‌ها همگی بر اساس ژن‌های با افزایش بیان در جوجه تجاری ترسیم شدند. در STRING هر تعامل با یک نمره ترکیبی از ۰ تا ۱ همراه است. در این پژوهش برای دریافت نتایج تعاملات قوی‌تر، فقط نمرات ترکیبی بالاتر از ۰/۴ در نظر گرفته شدند. در ادامه، افزونه ClusterONE از نرم افزار Cytoscape (<https://Cytoscape.org/> نسخه 3.5.1) با حداقل اندازه = ۶، حداقل تراکم = ۰/۰۵ و وزن لبه = "نمرات ترکیبی" برای کشف ماژول‌های کاربردی (زیر شبکه) در شبکه PPI استفاده شد. با استفاده از این ابزار، می‌توان پروتئین‌های مرتبط به یکدیگر را در شبکه‌های وزنی با استفاده از روش گسترش همسایگی (neighborhood expansion method) تشخیص داد. سه ماژول مهم برای تحلیل بیشتر انتخاب شدند. علاوه بر این، غنی‌سازی عملکرد ژن‌ها در ماژول‌ها با استفاده از روش توصیف شده برای شناسایی فرآیندهای بیولوژیکی مرتبط با هر یک از ماژول انجام شد.

جدول ۲- خلاصه دانسته‌های آماری داده‌های حاصل از توالی‌یابی نسل آینده

Table 2- Summary of reads from high throughput next generation sequencing

| Statistics / گروه / خصوصه                                    | Isfahanii-rep1<br>تکرار اول بومی | Isfahanii-rep2<br>تکرار دوم بومی | Ross-rep1<br>تکرار اول راس | Ross-rep2<br>تکرار دوم راس |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Raw reads<br>خوانش خام                                       | 21,502,417                       | 72,981,014                       | 19,102,055                 | 18,005,150                 |
| Clean reads<br>خوانش تمیز                                    | 21,502,238                       | 72,980,361                       | 19,101,872                 | 18,004,990                 |
| Mapped reads<br>خوانش نقشه یابی شده                          | 15,473,010                       | 51,057,061                       | 13,957,738                 | 13,429,922                 |
| Concordantly mapped reads<br>خوانش جفتی نقشه یابی شده        | 14,357,292                       | 47,029,073                       | 12,965,304                 | 12,569,816                 |
| Mapping rate (%)<br>درصد نقشه یابی                           | 71.96                            | 69.96                            | 73.07                      | 74.59                      |
| Read min/max/mean length<br>حداقل، حداکثر، میانگین طول خوانش | 50 / 150 / 133.3                 | 50 / 150 / 133.76                | 50 / 150 / 132.97          | 50 / 150 / 133.9           |



شکل ۱- درصد خوانش‌های نقشه‌یابی شده به نواحی اگزونی، اینترونی و بین ژنی.

Figure 1. The percentage of reads mapped to exonic, intronic and intergenic regions.

(Havenstein, Ferket, & Qureshi, 2003). بنابراین فعال شدن این مسیر لازمه رشدونمو سریع تر ماهیچه‌ها در جوجه تجاری است. بطور کلی غنی شدن این دو مسیر در جوجه تجاری نشانه رشد و نمو ماهیچه‌ای بیشتر و سوخت‌وساز فعال‌تر انرژی در مقایسه با جوجه بومی است. برخی از مهم‌ترین مسیرها و فرایندهای بیولوژیکی معنی‌دار در جوجه تجاری در جدول ۳ نشان داده شده است.

**تجزیه و تحلیل شبکه PPI و ماژول‌ها:** شبکه PPI با استفاده از پایگاه داده STRING و مجموعه داده Gallus gallus تشکیل شد. از مجموع ۳۲۱ ژن بیش بیان شده در جوجه تجاری، ۲۶۷ ژن با ۵۴۸ اثر متقابل در این شبکه شرکت داشتند. شبکه موجود نشان داد ۲۳ ژن دارای بالاترین درجه اثر متقابل با دیگر ژن‌ها هستند و بنابراین می‌توانند بعنوان ژن‌های هاب (Hub) در شبکه به شمار آیند (جدول ۴).

**تجزیه و تحلیل هستی‌شناسی ژن:** جهت تجزیه و تحلیل هستی‌شناسی (GO) و مسیرهای غنی شده KEGG از ابزار DAVID استفاده شد. از میان فرایندهای بیولوژیکی هستی‌شناسی معنی‌دار مرتبط با ژن‌های بیش بیان شده در جوجه تجاری، ۱۷ فرایند ارتباط مستقیم با ماهیچه و ۱۵ مسیر نیز مرتبط با رشد بودند. همچنین ژن‌های با بالاترین سطح بیان در جوجه تجاری در ۱۲ مسیر KEGG نظیر hsa04510:Focal adhesion با ۲۴ ژن و نیز hsa04512:ECM-receptor interaction با ۱۷ ژن شرکت داشتند. این دو مسیر در برهم کنش گیرنده‌های برون یاخته‌ای و فرآیند رشد بافت‌های پیرامونی و محافظتی ماهیچه‌ای نقش بسیار مهمی ایفا می‌نمایند. در جوجه تجاری مسیرهای hsa04151:PI3K-Akt signaling pathway با ۲۱ ژن و hsa03320:PPAR signaling pathway با ۸ ژن از جمله مهم‌ترین مسیرهای موثر در رشد ماهیچه بودند. مسیر نخست در فرایندهای رشد هایپرتروفی و رشد ماهیچه‌های اسکلتی دخالت داشته و افزایش فعالیت آن موجب افزایش ساخت پروتئین و اندازه ماهیچه شده (Shiojima & Walsh, 2002) و کاهش فعالیت این مسیر سیگنالی موجب افزایش تجزیه پروتئین‌های ماهیچه‌ای و منفی شدن تعادل بازگردش پروتئینی می‌شود (Song et al., 2015). مسیر دوم نیز مرتبط به سوخت و ساز چربی‌ها است (Kokta, Dodson, Gertler, & Hill, 2004). همچنین این مسیر در تمایز سلولی، رشدونمو و سوخت و ساز کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها نیز نقش حیاتی ایفا می‌کند (Dunning, Anastasi, Zhang, Russell, & Robker, 2014). اکنون بخوبی معلوم شده است که در جوجه‌های گوشتی افزایش رشد توام با افزایش بافت‌های چربی در بدن است (Zhao et al., 2011). همچنین در جوجه‌های با سرعت رشد بالا، ذخیره‌سازی چربی سریع‌تر و زودتر از جوجه‌های با سرعت رشد پائین انجام می‌شود

جدول ۳- برخی مسیرهای KEGG و فرایندهای بیولوژیکی معنی دار در جوجه تجاری

Table 3. Some enriched GO and KEGG pathway of DEGs in commercial chickens

| Term ID<br>شماره مسیر                                                                                       | Term<br>مسیر                 | Genes<br>ژن‌ها                                                                                                                                                                                                                          | P - Benj.<br>سطح معنی دار<br>بنجامینی |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Some Enriched KEGG Pathways for DEGs in commercial broiler<br>برخی از مسیرهای غنی شده در جوجه تجاری         |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| hsa04510                                                                                                    | Focal adhesion               | CAV1, PGF, TNC, ACTN1, ITGA4, MYL12A, COL5A2, COL5A1, COL4A6, COL4A5, MYL9, ITGA6, RAC2, JUN, COMP, ITGA8, COL6A3, COL6A2, COL6A1, PDGFRB, THBS1, PIK3R3, COL11A1, FN1                                                                  | 4.82E-09                              |
| hsa04512                                                                                                    | ECM-receptor interaction     | TNC, ITGA4, COL5A2, COL4A6, COL5A1, COL4A5, SDC1, CD36, ITGA6, COMP, ITGA8, COL6A3, COL6A2, COL6A1, THBS1, COL11A1, FN1                                                                                                                 | 5.56E-09                              |
| hsa04151                                                                                                    | PI3K-Akt signaling pathway   | SGK1, PGF, TNC, FGF16, ITGA4, COL5A2, COL5A1, COL4A6, COL4A5, ITGA6, COMP, ITGA8, COL6A3, COL6A2, PDGFRB, COL6A1, THBS1, PIK3R3, COL11A1, FN1, CSF1R                                                                                    | 0.001635                              |
| hsa03320                                                                                                    | PPAR signaling pathway       | LPL, CD36, PLIN1, SCD, PPARG, FADS2, FABP4, PLTP                                                                                                                                                                                        | 0.011706                              |
| Some Enriched GO Terms for DEGs in commercial broiler<br>برخی از فرایندهای بیولوژیکی معنی دار در جوجه تجاری |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| GO:0061061                                                                                                  | muscle structure development | MEF2B, CAV1, UCHL1, MYBPC3, SOX9, TGFB2, FOS, COL6A3, NFATC2, LMOD2, COL11A1, CSF1R, EGR1, ACTC1, LGALS1, CENPF, MSTN, CHODL, RCAN1, MYOZ2, MYH9, TNNI1, TNNT2, SDC1, ATF3, COL19A1, ATP2A2, CXCL14, ITGA8, FHOD3, HOPX, PDGFRB, ADAM12 | 2.10E-07                              |
| GO:0003012                                                                                                  | muscle system process        | ACTC1, CAV1, PTGS2, ACTA2, MYBPC3, MSTN, NR4A3, MYL12A, TPM2, DOCK5, TNNI1, MYL9, TNNT2, SSTR2, ATP2A2, CTGF, HMOX1, MYH13, LMOD2, KLF4, CHRN                                                                                           | 3.02E-04                              |
| GO:0055001                                                                                                  | muscle cell development      | ACTC1, SDC1, ATP2A2, UCHL1, FHOD3, PDGFRB, MYOZ2, LMOD2, NFATC2                                                                                                                                                                         | 0.041549137                           |
| GO:0001525                                                                                                  | angiogenesis                 | CAV1, NRP1, PTGS2, PGF, FGF16, ITGB2, TGFB2, CTGF, ROBO1, FAP, HMOX1, CCBE1, PLXND1, THBS1, RUNX1, FN1, CYR61, COL18A1, TNMD, MYH9, MCAM, SLIT2, ANXA2, SRPX2, SFRP2, F3, JUN, PDGFRB, HSPB1, KLF4                                      | 4.33E-09                              |

جدول ۴- ژن‌های هاب با بالاترین مقدار درجه اثر متقابل (&gt;10)


Table 4. Hub genes with highest connective degree (degree &gt; 10)

| Gene name<br>نام ژن | Degree<br>درجه | Module<br>ماژول | Gene name<br>نام ژن | Degree<br>درجه | Module<br>ماژول |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| JUN                 | 27             | 1               | HSPB1               | 14             | 1               |
| EGR1                | 21             | 1               | COL14A1             | 14             | 2               |
| CAV1                | 21             | 1               | COL6A2              | 14             | 2               |
| THBS1               | 21             | 2               | CD36                | 13             | 1               |
| ITGA4               | 21             | 2               | COL5A1              | 13             | 2               |
| RUNX1               | 19             | 1               | COL6A3              | 13             | 2               |
| ITGB2               | 19             | 2               | ACTA2               | 13             | 3               |
| ITGA8               | 18             | 2               | LUM                 | 12             | 2               |
| PPARG               | 17             | 1               | HMOX1               | 11             | 1               |
| SGK1                | 16             | 1               | SNAI2               | 11             | 1               |
| SDC1                | 16             | 2               | ATF3                | 11             | 1               |
| COMP                | 15             | 2               | -                   | -              | -               |



نمو ماهیچه شد. بر اساس تجزیه و تحلیل غنی‌شدگی DEGs در ماژول A، فرایندهایی نظیر سوخت و ساز چربی‌ها، رشد ونمو، رشد سیستم عروقی و کنترل مثبت سوخت و ساز پروتئین و پاسخ به سطح مواد مغذی معنی دار بودند (جدول شماره ۵). این فرایندها همگی در رشد هایپرتروفی موثر هستند.

با استفاده از ابزار ClusterONE سه ماژول با بیشترین سطح معنی‌داری در شبکه شناسایی شد (شکل شماره ۲). در ماژول A با ۴۱ گره (Node) و ۱۱۸ لبه (Edges) ژن JUN به بالاترین درجه اثرمتقابل را داشت. در ماژول B با ۲۳ گره و ۹۶ لبه، ژن‌های THBS1 و ITGA4 با ۲۱ لبه بالاترین درجه را داشتند. همچنین در ماژول C با ۱۱ گره و ۲۹ لبه ژن ACTA2 بالاترین میزان درجه را داشت. در این مطالعه نتایج تشکیل شبکه PPI منجر به شناسایی ماژول‌های مهمی در ارتباط با فرایندهای رشد و



شکل ۲- شبکه PPI و سه ماژول (خوشه) معنی‌دار. گره‌ها بیانگر ژن‌های با تفاوت معنی‌دار هستند (DEGs) و خطوط نشان‌دهنده اثرهای متقابل بین دو پروتئین. ماژول A به رنگ آبی، ماژول B به رنگ سبز و ماژول C به رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند. اندازه هر گره متناسب با مقدار درجه آن است.

Figure 2. The PPI network and three significant sub-networks

عروقی، تنظیم تبادلات بین خون و بافت‌های پیرامونی (Fernández-Hernando, Yu, Dávalos, Prendergast, & Sessa, 2010) و آنژیوژنز (رگ‌زایی) موثر است (Chidlow et al., 2009). همچنین در این ماژول سه عضو خانواده آنزیم‌های متالوپروتئینازهای ماتریکسی (Matrix metalloproteinases (MMPs)) حضور داشتند. این‌ها عبارت بودند از MMP7، MMP16 و MMP17. ژن‌های این خانواده در حفظ هومئوستاز فیبرهای ماهیچه‌ای و ماتریکس خارج سلولی نقش مهمی ایفا می‌نمایند (Carmeli, Moas, Reznick, & Coleman, 2004). این‌ها در پاسخ به محرک‌هایی نظیر تنش اکسیداتیو می‌توانند فعال شوند. این تنش در پاسخ به افزایش تقاضای اکسیژن بدلیل رشد و نمو بافت‌های ماهیچه‌ای می‌تواند ایجاد شده باشد. همچنین گزارش شده ژن‌های خانواده MMPs می‌توانند با تخریب بافت‌های همبند و کلاژنی اطراف فیبرهای ماهیچه‌ای موجب بازسازی ماتریکس خارج سلولی فیبرهای ماهیچه‌ای شوند (Alameddine, 2012). بطور کلی نتایج بدست آمده از بررسی ژن‌های این ماژول نشان می‌دهد این مجموعه در فرایندهای مهمی نظیر سوخت و ساز چربی، آنژیوژنز، واکنش‌های ایمنی و رشدونمو بافت ماهیچه‌ای شرکت کرده‌اند.

در ماژول A ژن هاب JUN که جزء خانواده فاکتورهای محرک رونویسی (Inducible transcriptional factors) ITFs است با یکی دیگر از اعضای این خانواده یعنی ژن FOSL2 پروتئینی را کد می‌کنند که می‌تواند منجر به ساخت کمپلکس رونویسی به نام پروتئین فعال کننده AP-1 (activating protein-1) شود. این پروتئین میانجی تعدادی از فرآیندهای سلولی تمایز و تکثیر است (Ameyar, Wisniewska, & Weitzman, 2003). معلوم شده است که محصول کدینگ پروتئین‌های FOSL2، JUN و FOS بطور معمول موجب تحریک رشد و تکثیر سلولی می‌شوند (Weinberg, 1996). یکی دیگر از اعضای این ماژول ژن EGR1 بود. پروتئین حاصل از کدهی این ژن، تنظیم‌کننده رونویسی برخی ژن‌های هدف دیگری است که محصولات کدینگ آن‌ها مورد نیاز تمایزبایی و فرایند میتوز است. همچنین این ژن در ساخت سلولی و تمایز کلاژن‌ها نیز دخالت می‌کند. دیگر نقش مهم این ژن تنظیم واکنش به فاکتورهای رشد است.

یکی دیگر از ژن‌های مهم این ماژول کاوئولین (CAV1) بود. این ژن که بخصوص در بافت‌های ماهیچه‌ای به وفور یافت می‌شود و پروتئین ساختمانی اصلی مورد نیاز برای ساخت کاوئولا در سلول‌های اندوتلیالی است. گزارش شده CAV1 در نفوذپذیری

جدول ۵- خصوصیات آماری ماژول‌های شناسایی شده با بالاترین سطح معنی‌داری در شبکه PPI

Table 5. Description statistics for identified modules with the highest significance in the PPI network

| Module<br>ماژول | Size<br>اندازه | P-value<br>سطح معنی دار | Genes<br>ژن‌ها                                                                                                                                                                                                                                                           | Some of significant GO terms and KEGG pathways<br>برخی مسیرها و فرایندهای بیولوژیکی معنی‌دار                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A               | 41             | 1.35E-07                | RUNX1, HSPA5, CAV1, MMP16, FOSL2, SNAI2, EGR1, KLF6, SCD, FABP4, PPARG, BMP5, MMP17, CTGF, FBN3, CHGB, RCAN1, NEATC2, CD36, MMP7, ATF3, CYR61, SERPINH1, ANXA5, HSPB1, HMOX1, JUN, KLF2, ATIC, AQP3, PTGS2, SGK1, ANXA2, F3, DUSP5, SOX9, GLIPR2, PLIN1, RNH1, LIPG, LPL | PPAR signaling pathway (P-adj<0.0007), developmental process (P-adj<5.68E-08), circulatory system development (P-adj<3.74E-07), positive regulation of protein metabolic process (P-adj<2.60E-06), regulation of apoptotic process (P-adj<3.74E-06), and response to nutrient levels (P-adj<2.90E-06)                           |
| B               | 23             | 1.90E-06                | THBS1, COMP, COL6A2, TNC, ITGA4, COL18A1, ITGB2, ITGA8, LUM, ALPL, COL4A5, COL4A6, COL6A3, SDC1, COL20A1, COL5A2, COL28A1, COL21A1, PLOD2, COL11A1, COL14A1, COL5A1, COL6A1                                                                                              | ECM-receptor interaction (P-adj<2.09E-19), Protein digestion and absorption (P-adj<2.05E-13), focal adhesion (P-adj<4.51E-13), PI3K-Akt signaling pathway (P-adj<1.62E-10), extracellular matrix organization (P-adj<1.93E-21), collagen metabolic process (P-adj<6.36E-11) and endodermal cell differentiation (P-adj<2.13E-7) |
| C               | 11             | 0.000801155             | TNNI1, ATP2A2, TNNT2, MYL9, MYBPC3, MYL12A, MYH9, ACTA2, MYH13, ANLN, TPM2                                                                                                                                                                                               | tight junction (P-adj<0.006), Hypertrophic cardiomyopathy (P-adj<0.02), muscle contraction (P-adj<8.60E-11), muscle system process (P-adj<2.18E-10), actin filament-based movement (P-adj<5.29E-7) and muscle structure development (P-adj<0.005)                                                                               |

در ماژول B دو ژن THBS1 و ITGA4 دارای بالاترین میزان درجه بودند. THBS1 یک گلیکوپروتئین مدولار (Medullar) بوده و در فرایندهای مختلفی نظیر رشد، چسبندگی آندوتلیالی و آنژیوژنز می‌تواند هم نقش میانجی مثبت و هم میانجی منفی را ایفا نماید (Tan, Tercero, Arnett, Wang, & Chakraborty, 2003). اینتگرین‌هایی (Integrin) نظیر ITGA4، ITGA8 و ITGB2 که در این ماژول وجود داشتند پروتئین‌هایی متشکل از زیرواحدهای آلفا و بتا بوده و در انتقال سیگنال‌های فعال‌کننده فرایندهای سلولی نظیر تکثیر و تمایز شرکت دارند (Danen & Sonnenberg, 2003). بعلاوه گزارش شده ITGA4 در تمایز میوژنی (Rosen et al., 1992)، تمایز ماهیچه اسکلتی و آنژیوژنز دخالت دارد (Sheppard, Onken, Rosen, Noakes, & Dean, 1994).

ژن‌های با تفاوت معنی‌دار موجود در ماژول B، در فرایندهایی نظیر سازماندهی ماتریکس خارج سلولی، ساخت و تجزیه کلاژن، سیگنال رشد هاپرتروفی PI3K/Akt، focal adhesion و تمایز سلولی اندودرمی شرکت داشتند. ماتریکس خارج سلولی یک شبکه کمپلکس از پروتئین‌های فیبری نظیر کلاژن‌ها، لامینین و الاستین بوده و نقش مهمی در حفظ ساختار بافتی ماهیچه دارد (Engel, Efimov, & Maurer, 1994). کلاژن جزء اصلی ماتریکس خارج سلولی بوده و فاکتور کلیدی در چسبندگی سلولی، مهاجرت سلولی، آنژیوژنز و مورفوژنز بافتی به شمار می‌آید (Tsang, Cheung, Chan, & Cheah, 2010). در این ماژول همچنین ۹ ژن کلاژنی نیز شرکت داشتند (جدول شماره ۵). از جمله آن‌ها، ژن COL4A5 (کلاژن نوع ۴) بود که از جمله فراوان‌ترین عناصر غشای پایه (basement membrane) است و یکی از فاکتورهای کلیدی ساخت آن به شمار می‌آید (Kühn et al., 1981). پروتئین‌های حاصل از کددهی ژن‌های COL5A1 (کلاژن نوع ۵) و COL11A1 (کلاژن نوع ۱۱) جز کلاژن‌های فیبری محسوب شده و در حدود ۹۰ درصد کل کلاژن را تشکیل می‌دهند. علاوه بر ژن‌های کلاژنی ژن‌های مرتبط با پروتئین ماتریکس دیگری نظیر تناسین (TNC)، COMP، ALPA، LUM و PLOD2 نیز در این ماژول حضور داشتند. ژن TNC یک گلیکوپروتئین خارج سلولی را کد می‌کند که به عنوان لیگاند

اینترگرین‌ها عمل کرده و در مهاجرت، چسبندگی سلولی، تمایز و تکثیر نقش تنظیم‌کننده ایفا می‌کند (Achouri, RIDER, VAN, 1997). بیان این ژن محدود به مکان‌هایی با بازگردش بالای سلولی نظیر لیگامنت‌ها و تاندون‌ها و فیبرهای ماهیچه‌ای صاف است (Walsh & Sallach, 1965). محصول ژن COMP در ساختار غضروف شرکت دارد. پروتئین حاصل از کددهی ژن ALPL در فرایندهای کلسیمی شدن بافت‌های منیرالی مختلف شرکت کرده (Thur et al., 2001) و فعالیت خارج سلولی این ژن جهت منیرالیزه شدن استخوان و غضروف ضروری است (de BERNARD, 1982). یکی از پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی LUM است که در فرایندهای مختلفی نظیر فیبری شدن بافتی، تنظیم آنژیوژنز و تکثیر سلولی نقش دارد (Krishnan et al., 2012). ژن PLOD2 نیز یکی از اجزا سازنده ماتریکس خارج سلولی بوده و در سفت و سخت شدن بافت‌های کلاژنی نقش دارد (van der Slot et al., 2003). همچنین در مسیر بیوسنتزی کلاژن، نخستین آنزیم کلیدی را کد می‌کند (Saha, Ghosh, Konar, Bhattacharya, & Roy, 2005).

فراوان بودن ژن‌های مرتبط با ماتریکس خارج سلولی، سیتوکین‌های التهابی و پروتئین‌های رشدونمویی و همچنین معنی‌دار شدن مسیرهای PI3K/Akt و Focal adhesion در این ماژول، همگی موید پتانسیل مرتبط این ماژول با فرآیند رشدونمو ماهیچه‌ای است.

در ماژول سوم ACTA2 تنها ژن هاب بود. این ژن از خانواده اکتین‌ها بوده و پروتئینی را کد می‌کند که بعنوان جزء اصلی دستگاه انقباضی نقش مهمی را در ماهیچه‌های اسکلتی ایفا می‌کند. گزارش شده سطح آلفا اکتین همبستگی مثبت با میزان ساخت پروتئین‌های فیبرهای ماهیچه‌ای و رشد آن دارد (Helferich et al., 1990). تجزیه و تحلیل نتایج معنی‌دار مشخص نمود ژن‌های این ماژول در انقباضات ماهیچه‌ای، انقباض سلولی و نیز نمو ساختمان ماهیچه اسکلتی دخالت دارند. در واقع انقباض ماهیچه‌ای معنی‌دارترین فرایند بیولوژیکی در این ماژول بود. تروپومیوزین ۲ (TPM2) یکی از اعضای این ماژول است که تروپومیوزین بتا را کد می‌کند. این پروتئین از اجزا سارکومری

به کند در این سن از عمر جوجه راس است. این نتایج نشان داد ماژول سوم در شکل‌گیری ساختمان و نمو پروتئین‌های ماهیچه‌ای شرکت دارد.

### نتیجه‌گیری

مطالعه شبکه ژن‌های مرتبط به بافت ماهیچه سینه جوجه تجاری راس و مقایسه آن با جوجه بومی اصفهان نشان داد که فعال‌تر بودن فرآیندهای سوخت و ساز و رشد هایپرتروفی در جوجه تجاری در مقایسه با جوجه بومی، منجر به بیش بیان شدن تعداد ژن‌های بیشتری شده است. بیش بیان شدن این ژن‌ها بویژه در فرایندهای بیولوژیکی مرتبط با رشد هایپرتروفی (PI3K/Akt) و متابولیسم چربی (PPAR signaling pathway)، منجر به برتری سرعت رشد این جوجه در مقایسه با جوجه بومی شد. با بررسی شبکه و ماژول‌های مرتبط با آن مشخص شد برای اصلاح نژاد جوجه بومی اصفهان و افزایش سرعت رشد ماهیچه سینه در این مرغ باید به روابط متقابل ژنی در هر ماژول و افزایش بیان ژن‌های هر سه ماژول و بخصوص ژن‌های هاب توجه خاص مبذول داشت.

### منابع

- Achouri, Y., RIDER, M. H., VAN SCHAFTINGEN, E., & Robbi, M. 1997. Cloning, sequencing and expression of rat liver 3-phosphoglycerate dehydrogenase. *Biochemical Journal*, 323(2), 365-370.
- Alameddine, H. S. 2012. Matrix metalloproteinases in skeletal muscles: friends or foes? *Neurobiology of disease*, 48(3), 508-518.
- Ameyar, M., Wisniewska, M., & Weitzman, J. 2003. A role for AP-1 in apoptosis: the case for and against. *Biochimie*, 85(8), 747-752.
- Bottje, W. G., Kong, B. W., Song, J. J., Lee, J. Y., Hargis, B. M., Lassiter, K., ... Hardiman, J. 2012. Gene expression in breast muscle associated with feed efficiency in a single male broiler line using a chicken 44K microarray. II. Differentially expressed focus genes. *Poultry Science*, 91(10), 2576-2587. doi: 10.3382/ps.2012-02204

فیلامنت نازک ماهیچه بوده و با باند شدن به فیلامنت اکتین در تنظیم انقباضات وابسته به کلسیم ماهیچه نقش مهمی را ایفا می‌کند (Palmieri et al., 2016). برای انجام انقباض، تحرک سلولی و شرکت در ساختمان پروتئین‌های میوفیبریل سلول‌های ماهیچه‌ای، وجود میوزین ضروری است (Smith, 1963). در این خصوص دو ژن میوزینی زنجیره سنگین (MYH9 و MYH13) و ژن زنجیره سبک (MYL9 و MYL12A) در این ماژول حضور داشتند. یکی از مهم‌ترین ژن‌های این ماژول TNNI1 بود که یک ایزوفرم از تروپونین I نوع فیبر کند ماهیچه‌ای را کد می‌کند. همچنین ژن ATP2A2 نیز در فیبرهای ماهیچه‌ای کند بیان شده و پروتئینی بنام SERCA2 را کد می‌کند که در انقباض و انبساط میوفیبریل‌ها و پمپ کلسیمی دخالت دارد (Periasamy et al., 1999). بیان ژن MYBPC3 در فیبرهای نوع کند ماهیچه اسکلتی و قلبی گزارش شده است (Lin et al., 2013). این ژن جزء خانواده‌ای از ژن‌هایی است که کدکننده پروتئین‌های اجزاء اصلی ساختمان سارکومری در ماهیچه‌های مخطط به شمار می‌آیند (Tajsharghi et al., 2010). با توجه به اینکه اغلب فیبرهای ماهیچه سینه در جوجه از نوع سریع هستند بیش بیان شدن این ژن‌ها در ۲۸ روزگی نشانه شیف‌ت در ساخت نوع فیبرهای سریع

- Carmeli, E., Moas, M., Reznick, A. Z., & Coleman, R. 2004. Matrix metalloproteinases and skeletal muscle: a brief review. *Muscle & nerve*, 29(2), 191-197.
- Chidlow, J. H., Greer, J. J., Anthoni, C., Bernatchez, P., Fernandez-Hernando, C., Bruce, M., ... Sessa, W. C. 2009. Endothelial caveolin-1 regulates pathologic angiogenesis in a mouse model of colitis. *Gastroenterology*, 136(2), 575-584. e572.
- Cui, H.-X., Liu, R.-R., Zhao, G.-P., Zheng, M.-Q., Chen, J.-L., & Wen, J. 2012. Identification of differentially expressed genes and pathways for intramuscular fat deposition in pectoralis major tissues of fast-and slow-growing chickens. *BMC genomics*, 13(1), 1.
- Danen, E. H., & Sonnenberg, A. 2003. Erratum: Integrins in regulation of tissue development and function. *J Pathol*; 200: 471-480. *The Journal of pathology*, 201(4), 632-641.

- Davis, A. J., & Austic, R. E. 1997.** Dietary protein and amino acid levels alter threonine dehydrogenase activity in hepatic mitochondria of *Gallus domesticus*. *The Journal of nutrition*, 127(5), 738-744.
- de BERNARD, B. 1982.** Glycoproteins in the local mechanism of calcification. *Clinical orthopaedics and related research*, 162, 233-244.
- Dennis, G., Sherman, B. T., Hosack, D. A., Yang, J., Gao, W., Lane, H. C., & Lempicki, R. A. 2003.** DAVID: database for annotation, visualization, and integrated discovery. *Genome biology*, 4(9), 1.
- Dunning, K. R., Anastasi, M. R., Zhang, V. J., Russell, D. L., & Robker, R. L. 2014.** Regulation of fatty acid oxidation in mouse cumulus-oocyte complexes during maturation and modulation by PPAR agonists. *PloS one*, 9(2), e87327.
- Engel, J., Efimov, V. P., & Maurer, P. 1994.** Domain organizations of extracellular matrix proteins and their evolution. *Development*, 1994(Supplement), 35-42.
- Fernández-Hernando, C., Yu, J., Dávalos, A., Prendergast, J., & Sessa, W. C. 2010.** Endothelial-specific overexpression of caveolin-1 accelerates atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient mice. *The American journal of pathology*, 177(2), 998-1003.
- Guernec, A., Berri, C., Chevalier, B., Wacrenier-Cere, N., Le Bihan-Duval, E., & Duclos, M. 2003.** Muscle development, insulin-like growth factor-I and myostatin mRNA levels in chickens selected for increased breast muscle yield. *Growth hormone & IGF research*, 13(1), 8-18.
- Hall, S. J. G., & Bradley, D. G. 1995.** Conserving livestock breed biodiversity. *Trends in Ecology & Evolution*, 10(7), 267-270. doi: [http://dx.doi.org/10.1016/0169-5347\(95\)90005-5](http://dx.doi.org/10.1016/0169-5347(95)90005-5)
- Havenstein, G., Ferket, P., & Qureshi, M. 2003.** Carcass composition and yield of 1957 versus 2001 broilers when fed representative 1957 and 2001 broiler diets. *Poultry Science*, 82(10), 1509-1518.
- Helferich, W., Jump, D., Anderson, D., Skjaerlund, D., Merkel, R., & Bergen, W. 1990.** Skeletal muscle  $\alpha$ -actin synthesis is increased pretranslationally in pigs fed the phenethanolamine ractopamine. *Endocrinology*, 126(6), 3096-3100.
- Kim, D., Langmead, B., & Salzberg, S. L. 2015.** HISAT: a fast spliced aligner with low memory requirements. *Nat Meth*, 12(4), 357-360. doi: 10.1038/nmeth.3317  
<http://www.nature.com/nmeth/journal/v12/n4/abs/nmeth.3317.html#supplementary-information>
- Kokta, T., Dodson, M., Gertler, A., & Hill, R. 2004.** Intercellular signaling between adipose tissue and muscle tissue. *Domestic animal endocrinology*, 27(4), 303-331.
- Krishnan, A., Li, X., Kao, W.-Y., Viker, K., Butters, K., Masuoka, H., . . . Charlton, M. 2012.** Lumican, an extracellular matrix proteoglycan, is a novel requisite for hepatic fibrosis. *Laboratory investigation*, 92(12), 1712-1725.
- Kühn, K., Wiedemann, H., Timpl, R., Risteli, J., Dieringer, H., Voss, T., & Glanville, R. W. 1981.** Macromolecular structure of basement membrane collagens: Identification of 7 S collagen as a crosslinking domain of type IV collagen. *FEBS letters*, 125(1), 123-128.
- Lin, B., Govindan, S., Lee, K., Zhao, P., Han, R., Runte, K. E., . . . Sadayappan, S. 2013.** Cardiac myosin binding protein-C plays no regulatory role in skeletal muscle structure and function. *PloS one*, 8(7), e69671.
- Lohse, M., Bolger, A., Nagel, A., Fernie, A. R., Lunn, J. E., Stitt, M., & Usadel, B. 2012.** RobiNA: a user-friendly, integrated software solution for RNA-Seq-based transcriptomics. *Nucleic acids research*, gks540.
- Muramatsu, T., Hiramoto, K., & Okumura, J. 1990.** Strain differences in whole-body protein turnover in the chicken embryo. *Br Poult Sci*, 31. doi: 10.1080/00071669008417234
- Oksbjerg, N., Gondret, F., & Vestergaard, M. 2004.** Basic principles of muscle development and growth in meat-producing mammals as affected by the insulin-like growth factor (IGF) system. *Domestic animal endocrinology*, 27(3), 219-240.
- Palmieri, O., Mazza, T., Merla, A., Fusilli, C., Cuttitta, A., Martino, G., . . . Palumbo, O. 2016.** Gene expression of muscular and neuronal pathways is cooperatively dysregulated in patients with idiopathic achalasia. *Scientific Reports*, 6.
- Periasamy, M., Reed, T. D., Liu, L. H., Ji, Y., Loukianov, E., Paul, R. J., . . . Doetschman, T. 1999.** Impaired cardiac performance in heterozygous mice with a null mutation in the sarco (endo) plasmic reticulum  $\text{Ca}^{2+}$ -ATPase isoform 2 (SERCA2) gene. *Journal of Biological Chemistry*, 274(4), 2556-2562.
- Rosen, G. D., Sanes, J. R., LaChance, R., Cunningham, J. M., Roman, J., & Dean, D. C. 1992.** Roles for the integrin VLA-4 and its counter receptor VCAM-1 in myogenesis. *Cell*, 69(7), 1107-1119.
- Saha, S. K., Ghosh, P., Konar, A., Bhattacharya, S., & Roy, S. S. 2005.** Differential expression of procollagen lysine 2-oxoglutarate 5-deoxygenase and matrix metalloproteinase isoforms in hypothyroid rat ovary and disintegration of extracellular matrix. *Endocrinology*, 146(7), 2963-2975.

- Saunderson, C. L., & Leslie, S. 1988. Muscle growth and protein degradation during early development in chicks of fast and slow growing strains. *Comp Biochem Physiol A*, 89. doi: 10.1016/0300-9629(88)91035-3
- Schiaffino, S., Dyar, K. A., Ciciliot, S., Blaauw, B., & Sandri, M. 2013. Mechanisms regulating skeletal muscle growth and atrophy. *FEBS Journal*, 280(17), 4294-4314. doi: 10.1111/febs.12253
- Sheppard, A. M., Onken, M. D., Rosen, C. D., Noakes, P. G., & Dean, D. C. 1994. Expanding roles for  $\alpha 4$  integrin and its ligands in development. *Cell Communication & Adhesion*, 2(1), 27-43.
- Shiojima, I., & Walsh, K. 2002. Role of Akt signaling in vascular homeostasis and angiogenesis. *Circulation research*, 90(12), 1243-1250.
- Smith, J. H. 1963. Relation of Body Size to Muscle Cell Size and Number in the Chicken 1, 2. *Poultry Science*, 42(2), 283-290.
- Song, H. K., Kim, J., Lee, J. S., Nho, K. J., Jeong, H. C., Kim, J., . . . Park, W. J. 2015. Pik3ip1 modulates cardiac hypertrophy by inhibiting PI3K pathway. *PloS one*, 10(3), e0122251.
- Szklarczyk, D., Franceschini, A., Wyder, S., Forslund, K., Heller, D., Huerta-Cepas, J., . . . Tsafou, K. P. 2014. STRING v10: protein-protein interaction networks, integrated over the tree of life. *Nucleic acids research*, gku1003.
- Tajsharghi, H., Leren, T. P., Abdul-Hussein, S., Tulinius, M., Brunvand, L., Dahl, H. M., & Oldfors, A. 2010. Unexpected myopathy associated with a mutation in MYBPC3 and misplacement of the cardiac myosin binding protein C. *Journal of medical genetics*, 47(8), 575-577.
- Tan, F. K., Tercero, G. M., Arnett, F. C., Wang, N., & Chakraborty, R. 2003. Examination of the possible role of biologically relevant genes around FBN1 in systemic sclerosis in the Choctaw population. *Arthritis & Rheumatism*, 48(11), 3295-3296.
- Thur, J., Rosenberg, K., Nitsche, D. P., Pihlajamaa, T., Ala-Kokko, L., Heinegård, D., . . . Maurer, P. 2001. Mutations in cartilage oligomeric matrix protein causing pseudoachondroplasia and multiple epiphyseal dysplasia affect binding of calcium and collagen I, II, and IX. *Journal of Biological Chemistry*, 276(9), 6083-6092.
- Trapnell, C., Williams, B. A., Pertea, G., Mortazavi, A., Kwan, G., Van Baren, M. J., . . . Pachter, L. 2010. Transcript assembly and quantification by RNA-Seq reveals unannotated transcripts and isoform switching during cell differentiation. *Nature biotechnology*, 28(5), 511-515.
- Tsang, K. Y., Cheung, M. C., Chan, D., & Cheah, K. S. 2010. The developmental roles of the extracellular matrix: beyond structure to regulation. *Cell and tissue research*, 339(1), 93-110.
- van der Slot, A. J., Zuurmond, A.-M., Bardoel, A. F., Wijmenga, C., Pruijs, H. E., Sillence, D. O., . . . Verzijl, N. 2003. Identification of PLOD2 as telopeptide lysyl hydroxylase, an important enzyme in fibrosis. *Journal of Biological Chemistry*, 278(42), 40967-40972.
- Walsh, D., & Sallach, H. 1965. Purification and properties of chicken liver D-3-phosphoglycerate dehydrogenase. *Biochemistry*, 4(6), 1076-1085.
- Weinberg, R. A. 1996. How cancer arises. *Scientific American*, 275(3), 62-71.
- Xu, Y., Qian, H., Feng, X., Xiong, Y., Lei, M., Ren, Z., . . . Yuan, H. 2012. Differential proteome and transcriptome analysis of porcine skeletal muscle during development. *Journal of proteomics*, 75(7), 2093-2108.
- Yin, H., Zhang, S., Gilbert, E., Siegel, P., Zhu, Q., & Wong, E. 2014. Expression profiles of muscle genes in postnatal skeletal muscle in lines of chickens divergently selected for high and low body weight. *Poultry Science*, 93(1), 147-154.
- Yousefi Zonuz, A., Alijani, S., Mohammadi, H., Rafat, A., & Daghigh Kia, H. 2013. Estimation of genetic parameters for productive and reproductive traits in Esfahan native chickens. *Journal of Livestock Science and Technologies*, 1(2), 34-38.
- Zhao, X., Mo, D., Li, A., Gong, W., Xiao, S., Zhang, Y., . . . Liu, X. 2011. Comparative analyses by sequencing of transcriptomes during skeletal muscle development between pig breeds differing in muscle growth rate and fatness. *PloS one*, 6(5), e19774.
- Zheng, Q., Zhang, Y., Chen, Y., Yang, N., Wang, X.-J., & Zhu, D. 2009. Systematic identification of genes involved in divergent skeletal muscle growth rates of broiler and layer chickens. *BMC genomics*, 10(1), 87.

## Study of the genetic network that affecting the growth of pectoralis muscle in Ross chickens under RNA-Seq data

Seyed Nader Albooshoke<sup>1</sup>, Mojtaba Tahmoorepur<sup>2\*</sup>, Mohammad Reza Bakhtiarizadeh<sup>3</sup>,  
Mohammadreza Nassiri<sup>2</sup>, Saied Esmaeilkhani<sup>4</sup>

1- Department of Animal Science, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ahwaz, Iran.

2- Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3- Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, College of Aburaihan, Iran.

4- Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

\*Email corresponding author: Tahmoores@um.ac.ir

### Abstract

Native chicken breeds are important genetic resource and well adapted to the local environmental conditions. However, growth rate and feed efficiency of these breeds are not appropriate. Comparative studies of commercial and native chickens provide an opportunity to characterize the biological basis of differences between them. Here, RNA-Seq technology was used to investigate differences in the transcriptomes of breast muscle-related genes and associated pathways between Ross and Isfahani's native breed. In this study, 200 birds of the Ross 708 strain and 200 native chicks of Isfahani native were reared in a similar standard management and feeding manner. In analyzing RNA-Seq data between two experimental groups, the gene expression profile was compared in 4 chicken breast samples of 28 days of life of the chicks. Statistical comparison of the gene expressions in two groups revealed, 606 significantly DEGs (differentially expressed genes). In commercial breed, 357 DEGs were upregulated and 249 down-regulated, P-adjusted  $\leq 0.05$ . PPI (Protein-protein interaction) network of DEGs (up regulated in commercial) was constructed and 267 genes were included in the resulted PPI network of which 75 genes were identified in the form of three modules with a maximum level of significance. Gene ontology studies showed that all three modules played an effective role in the growth of pectoralis muscle and their hub genes with maximum degree were JUN, EGR1, THBS1, ITGA4 and ACTA2.

**Keywords:** Ross chicken, Gene network, Muscle, Gene Ontology, RNA-Seq